



Сибирская язва - это острое инфекционное заболевание, источником которого является больное животное.

## КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ?

Существуют 3 пути передачи инфекции:

	<p><b>Кожная форма</b>                      возбудитель попадает через слизистые оболочки и кожу (ссадины, порезы) человека</p>		<p><b>Кишечная форма</b>                      при непосредственном употреблении зараженного продукта</p>		<p><b>Легочная форма</b>                      при вдыхании воздуха, зараженного сибирязвенными бактериями</p>
--	---	--	--	--	---

## КАКИЕ БЫВАЮТ СИМПТОМЫ СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ?

Через несколько часов или 4-7 дней с момента заражения появляются следующие признаки:


- резкое повышение температуры тела до 39-40 градусов;
- выраженная интоксикация: головная боль, мышечная слабость, ощущение разбитости в теле;
- участок уплотнения с кожным зудом с постепенным покраснением, локальным повышением температуры, образованием язвочки и нагноением.

## ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ?

При появлении первых признаков заболевания, нельзя заниматься самолечением, а необходимо сразу же обратиться ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение. При своевременном обращении к врачу и проведении специфического лечения заболевание, как правило, заканчивается полным выздоровлением.

## КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАРАЖЕНИЕ СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ:

- соблюдать правила личной гигиены при уходе за скотом и контакте с продуктами животноводства;
- не приобретать у случайных лиц мясо и мясные продукты (колбасы, сардельки, сосиски, фарш) не прошедшие специальный ветеринарный контроль и не имеющие соответствующего разрешения на продажу;
- сообщать ветеринарным специалистам о каждом случае заболевания, вынужденного убоя или гибели животных;
- не утилизировать самостоятельно трупы павших животных.





Сібір жарасы-жедел инфекциялық ауру, бұл аурудың көзі - мал болып табылады.

## СІБІР ЖАРАСЫ ҚАНДАЙ ЖОЛДАРМЕН ЖҰҒАДЫ?

Инфекция 3 жолмен жұғады:

	<p><b>Теріге</b></p> <p>қоздырғыш, адамның сілемейлі қабат және тері (жара, кесілген жер) арқылы түседі</p>		<p><b>Ішекке</b></p> <p>залалды азық-түлікті тұтынғанда</p>		<p><b>Өкпеге</b></p> <p>сібір жарасы бактериясымен демалғанда</p>
--	---	--	---	--	---

## СІБІР ЖАРАСЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ ҚАНДАЙ?

Ауру жұққаннан кейін бірнеше сағаттан кейін немесе 4-7 күнде келесі белгілер байқалады:

- бірден 39-40 градусқа дейін дене қызуының жоғарылауы;
- уланудың байқалуы: бастың ауыруы, бұлшықеттің әлсіреуі, дененің делсалдануы;
- терінің қышып, біртіндеп қызарған жердің қатаюы, жергілікті дене қызуының жоғарылауы, жара мен іріңнің пайда болуы.

## АУРУ БЕЛГІЛЕРІ ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА НЕ ІСТЕУ ҚАЖЕТ?

Аурудың алғашқы белгілері пайда болған жағдайда өздігімен емделмей, бірден жақын жердегі емдеу-профилактикалық мекемеге МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕККЕ жүгіну қажет. Дәрігерге уақытында жүгініп, ауруға арнайы ем тағайындаған жағдайда толықтай жазылып кетеді.

## СІБІР ЖАРАСЫН ЖҰҚТЫРУДЫҢ ҚАЛАЙ АЛДЫН АЛУҒА БОЛАДЫ:

- малға күтім жасағанда және мал шаруашылығы өнімдерімен байланысқанда жеке тазалық ережесін сақтау;
- арнайы мал дәрігерінің бақылаудан өтпеген және сатуға тиісті рұқсаты болмаған кездейсоқ тұлғалардан ет және ет өнімдерін (шұжық, қысқа шұжық, сосискалар, тартылған ет) алмау;
- әр ауру оқиғасы, мәжбүрлі түрде сойылған мал немесе жануардың өлімі туралы мал дәрігерлеріне хабарлау;
- өлген малдың өлігін өз еркімен пайдаланбау.

