



ЧТО ТАКОЕ ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ?

Пневмококковая инфекция – это инфекция, вызываемая бактериями *Streptococcus pneumoniae*.

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ?

Пневмококковая инфекция может вызвать серьезные заболевания, в том числе:

- сепсис (заражение крови);
- менингит (воспаление мозговых оболочек);
- пневмония;
- отит (ушные инфекции);
- синусит и др.

КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ?

Бактерия передается:



воздушно - капельным путем:
кашель, чихание,
дыхание



контактно - бытовым путем:
загрязненные предметы,
игрушки и т.д.

КТО НАХОДИТСЯ В ГРУППЕ РИСКА?

Пневмококковая инфекция чаще всего встречается у детей до 5 лет и взрослых старше 65 лет.



СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВАКЦИНА ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ?

Да, существует. С 2010 года в календарь профилактических прививок Республики Казахстан внедрена вакцинация против пневмококковой инфекции.

КАКИЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ?

Согласно Национальному календарю профилактических прививок:

<i>Первая</i>	<i>Вторая</i>
<i>вакцинация</i>	<i>вакцинация</i>
<i>в 2 месяца</i>	<i>в 4 месяца</i>

Ревакцинация
в 12-15 месяцев

КАКИЕ ВИДЫ ВАКЦИН ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ?

Используются два вида вакцин – пневмококковая белково-полисахаридная конъюгированная вакцина (ПКВ) и пневмококковая полисахаридная (ППВ).

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПКВ И ППВ?

Для вакцинации детей первых лет жизни используют только ПКВ.
Для лиц старше 65 лет - ППВ.

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРИВИВОЧНЫЕ РЕАКЦИИ?

- ! - На ПКВ: покраснение, уплотнение/отек, болезненность в месте инъекции, раздражительность, сонливость, снижение аппетита.
- ! - На ППВ: покраснение, болезненность длительностью до 48 часов в месте инъекции, редко кратковременное повышение температуры.

Поствакцинальных осложнений на вакцину против пневмококковой инфекции не зарегистрировано.



ПНЕВМОКОККТІК ИНФЕКЦИЯ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

Пневмококктік инфекция – *Streptococcus pneumoniae* бактериясы тудыратын инфекция.

ПНЕВМОКОККТІК ИНФЕКЦИЯ ҚАНДАЙ АУРУЛАРДЫ ТУДЫРАДЫ?

Пневмококктік инфекция қатерлі аурулар тудыруы мүмкін, соның ішінде:

- сепсис (қанның зақымдалуы);
- менингит (ми қабығының қабынуы);
- пневмония;
- отит (құлақ инфекциялары);
- синусит және т.б.

ПНЕВМОКОККТІК ИНФЕКЦИЯ ҚАЛАЙ ТАРАЙДЫ?

Бактерия:



ауа-тамшылары арқылы:
жөтелгенде, түшкіргенде,
демалғанда;

тұрмыстық байланыс арқылы:
таза емес заттар,
ойыншықтардан және
т.б. жұғады

ҚАУІПТІ ТОПҚА КІМДЕР ЖАТАДЫ?

Пневмококктік инфекция көбінесе 5 жасқа дейінгі балалар мен 65 жастан асқан адамдарда кездеседі.



ПНЕВМОКОККТИК ИНФЕКЦИЯҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНА БАР МА?

Иә, бар. 2010 жылдан бастап Қазақстан Республикасының профилактикалық екпе күнтізбесіне пневмококк инфекциясына қарсы вакцинация енгізілді.

БАЛАЛАРҒА ВАКЦИНАЦИЯ ЖҮРГІЗУ МЕРЗІМІ ҚАНДАЙ?

Профилактикалық екпенің ұлттық күнтізбесіне сәйкес:

Бірінші
вакцинация
2 айында

Екінші
вакцинация
4 айында

Ревакцинация
12-15 айында


ПНЕВМОКОККТИК ИНФЕКЦИЯҒА ҚАНДАЙ ВАКЦИНА ТҮРІ ҚОЛДАНЫЛАДЫ?

Вакцинаның екі түрі қолданылады – пневмококктік ақуызды-полисахаридтік конъюгирленген (ПКВ) және пневмококктік полисахаридтік (ППВ) вакцина.

ПКВ ЖӘНЕ ППВ ҚАЙ ЖАСТА ҚОЛДАНЫЛАДЫ?

Алғашқы жылы балаларды вакцинациялау үшін тек ПКВ, ал 65 жастан үлкендерге ППВ қолданылады.

ЕКПЕНІҢ РЕАКЦИЯСЫ ҚАНДАЙ БОЛАДЫ?

- 
- ПКВ-ға: қызару, қатаю/ісіну, ине орнының ауырсынуы, тітіркенгіш, ұйықышылдық, тәбеттің төмендеуі.
 - ППВ-ға: қызару, 48 сағатқа дейін ине орнының ауырсынуы, өте сирек қысқа мерзімді дене қызуының көтерілуі.

Пневмококктік инфекцияға қарсы вакцинациядан кейінгі асқыну тіркелген жоқ.